

Хронические вирусные гепатиты с аутоиммунными нарушениями

У части больных хроническими вирусными гепатитами могут наблюдаться те же системные проявления, которые наблюдаются при аутоиммунном гепатите. Это может проявляться как собственно аутоиммунным поражением печени (имеющим свою морфологическую картину и определенный профиль аутоиммунных антител, выявляемых в сыворотке крови), так и внепеченочными проявлениями.

Клинические проявления.

Заподозрить клинически наличие аутоиммунных нарушений можно при выявлении у пациента с ХВГ следующих симптомов и синдромов: лихорадки, кожного васкулита, артралгии и артрита, миалгии, полимиозита, миокардита, тиреоидита и гломерулонефрита и т.д.

Лабораторные признаки.

Лабораторными признаками аутоиммунных нарушений являются: тромбоцитопения, гиперэозинофилия, гипергаммаглобулинемия за счет преимущественного повышения IgG, наличие в крови ревматоидного фактора (КР), обнаружение LE-клеток.

У пациентов с аутоиммунными нарушениями выявляются аутоантитела из которых диагностическое значение при ХВГ имеют следующие: ANA (антиядерные антитела), SMA (антитела к гладкой мускулатуре), LKM-1 (печень/почки микросомальные антитела-1), анти тиреоидные антитела.

Диагноз.

Если у пациента с ХВГ выявляются клинические симптомы аутоиммунных нарушений в сочетании с лабораторными признаками этих нарушений (аутоиммунные антитела или иные лабораторные признаки) ставится диагноз хронического вирусного гепатита с аутоиммунными нарушениями.

Пример формулировки диагноза: **"хронический гепатит С с умеренной активностью, с выраженным фиброзом, вне фазы репликации HCV, с аутоиммунными нарушениями"**.